

資料⑱ がん化学療法院内登録レジメン集

●抗がん剤略号一覧

略号	一般名	医薬品名
5-FU	フルオロウラシル	5-FU注250協和*
ADM	ドキシソルピシン塩酸塩	アドリアシン注用10
B-mab	ベバシズマブ	アバスチン点滴静注用100mg/4mL、400mg/16mL
CDDP	シスプラチン	シスプラチン注10mg、25mg、50mg
CPT-11	イリノテカン塩酸塩水和物	イリノテカン点滴静注液「タイホウ」40mg、100mg
DTX	ドセタキセル水和物	タキソテール点滴静注用20mg、80mg
GEM	ゲムシタビン塩酸塩	ゲムシタビン点滴静注用200mg、1g
ℓ-LV	レボホリナートカルシウム	アイソボリン点滴静注用25mg、100mg
ℓ-OHP	オキサリプラチン	オキサリプラチン点滴静注液50mg、100mg、200mg
MTX	メトトレキサート	注射用メトトレキサート50mg
nab-PTX	パクリタキセル	アブラキサン点滴静注用100mg
P-mab	パニツムマブ	ベクティビックス点滴静注100mg、400mg
PTX	パクリタキセル	パクリタキセル注射液「NK」30mg、100mg
S-1	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	エスワンタイホウ配合OD錠T20*、T25*
VLB	ビンブラスチン硫酸塩	エクザール注射用10mg
	カペシタビン	ゼローダ錠300*

注)*印以外の医薬品は臨時購入医薬品となります

●抗がん剤の輸液ポンプ使用区分

薬剤分類	薬剤名	輸液ポンプ使用区分
起壊死性抗がん剤	アブラキサン点滴静注用 エクザール注射用 タキソテール点滴静注用	×:壊死性のため強制圧を加える輸液ポンプは使用禁止
炎症性抗がん剤	5-FU注 アクプラ静注用 オキサリプラチン点滴静注液 ゲムシタビン点滴静注液 イリノテカン点滴静注 パラプラチン注射液 シスプラチン注	△:炎症性のため強制圧を加える輸液ポンプは原則使用禁止、CVポートなどもれのリスクは低い場合に限りドリップ・アイがない場合はやむなく輸液ポンプ使用可
非炎症性抗がん剤	アバスチン注 アービタックス注 ハーセプチン注 ベクティビックス注 リツキサン注	○:非炎症性のため強制圧を加える輸液ポンプでも使用可能

詳細は臨床工学科まで

【対象疾患】 胃がん

【レジメン名】 S-1+CDDP(SP)

【1クール】 35 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
S-1	80mg/m ² /日	内服	分2朝夕食後	day1-21
CDDP	60mg/m ²	点滴静注	2時間	day8

【備考】

【対象疾患】 胃がん

【レジメン名】 PTX 【1クール】 21 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
PTX	210mg/m ²	点滴静注	3時間	day1

【備考】

【対象疾患】 胃がん

【レジメン名】 weekly PTX 【1クール】 28 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
PTX	80mg/m ²	点滴静注	1時間以上	day1.8.15

【備考】

【対象疾患】 胃がん

【レジメン名】 CDDP+カヘシタビン(XP) 【1クール】 21 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
CDDP	80mg/m ²	点滴静注	2時間	day1
カヘシタビン	下記参照	内服	分2朝夕食後	day1-14

【備考】 カヘシタビン標準投与量

体表面積 1.36m²未満:2400mg/日

1.36m²以上1.66m²未満:3000mg/日

1.66m²以上1.96m²未満:3600mg/日

1.96m²以上:4200mg/日

【対象疾患】 胃がん

【レジメン名】 S-1+PTX 【1クール】 21 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
S-1	80mg/m ² /日	内服	分2朝夕食後	day1-14
PTX	50mg/m ²	点滴静注	1時間	day1.8

【備考】

【対象疾患】 胃がん

【レジメン名】 S-1+PTX 【1クール】 28 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
S-1	80mg/m ² /日	内服	分2朝夕食後	day1-14
PTX	50mg/m ²	点滴静注	1時間	day1.8.15

【備考】

【対象疾患】 胃がん

【レジメン名】 PTX+R-mab 【1クール】 28 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
R-mab	8mg/kg	点滴静注	1時間	day1.15
PTX	80mg/m ²	点滴静注	1時間	day1.8.15

【備考】

【対象疾患】 胃がん

【レジメン名】 R-mab 【1クール】 14 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
R-mab	8mg/kg	点滴静注	1時間	day1

【備考】

【対象疾患】 肝がん

【レジメン名】 Low dose FP(肝動注) 【1クール】 28 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
CDDP	10mg/body	肝動注	1時間	5days/w×4w
5-FU	250mg/body	肝動注	5時間	5days/w×4w

【備考】

【対象疾患】 食道がん

【レジメン名】 FP 【1クール】 28 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
5-FU	800mg/m ²	点滴静注	24時間	day1-5
CDDP	80mg/m ²	点滴静注	2時間	day1

【備考】

【対象疾患】 大腸がん

【レジメン名】 mFOLFOX6+B-mab 【1クール】 14 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
B-mab	5mg/kg	点滴静注	初回90分	day1
0-OHP	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day1
0-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day1
5-FU	400mg/m ²	静注		day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1

【備考】

【対象疾患】 大腸がん

【レジメン名】 FOLFIRI+B-mab 【1クール】 14 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
B-mab	5mg/kg	点滴静注	初回90分	day1
CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	90分	day1
ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day1
5-FU	400mg/m ²	静注		day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1

【備考】

【対象疾患】 大腸がん

【レジメン名】 5-FU+ℓ-LV 【1クール】 56 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
ℓ-LV	250mg/m ²	点滴静注	2時間	day1.8.15.22.29.36
5-FU	600mg/m ²	静注	■ -LV開始1時間後	day1.8.15.22.29.36

【備考】

【対象疾患】 大腸がん

【レジメン名】 XELOX+B-mab 【1クール】 21 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
B-mab	7.5mg/kg	点滴静注	初回90分	day1
ℓ-OHP	130mg/m ²	点滴静注	2時間	day1
カペシタビン	下記参照	内服	分2朝夕食後	day1-14

【備考】 カペシタビン標準投与量

体表面積 1.36m²未満:2400mg/日

1.36m²以上1.66m²未満:3000mg/日

1.66m²以上1.96m²未満:3600mg/日

1.96m²以上:4200mg/日

【対象疾患】 大腸がん

【レジメン名】 SOX+B-mab 【1クール】 21 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
B-mab	7.5mg/kg	点滴静注	初回90分	day1
ℓ-OHP	130mg/m ²	点滴静注	2時間	day1
S-1	80-120mg/body/日	内服	分2朝夕食後	day1-14

【備考】

【対象疾患】 大腸がん

【レジメン名】 IRIS+B-mab 【1クール】 28 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
B-mab	5mg/kg	点滴静注	初回90分	day1.15
CPT-11	100mg/m ²	点滴静注	90分	day1.15
S-1	80-120mg/body/日	内服	分2朝夕食後	day1-14

【備考】

【対象疾患】 大腸がん

【レジメン名】 IFL 【1クール】 42 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
CPT-11	125mg/m ²	点滴静注	90分	day1.8.15.22
5-FU	500mg/m ²	静注		day1.8.15.22
ℓ-LV	20mg/m ²	静注		day1.8.15.22

【備考】

【対象疾患】 大腸がん

【レジメン名】 IRIS+B-mab 【1クール】 21 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
B-mab	7.5mg/kg	点滴静注	初回90分	day1
CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	90分	day1
S-1	80-120mg/body/日	内服	分2朝夕食後	day1-14

【備考】

【対象疾患】 大腸がん

【レジメン名】 FOLFIRI+P-mab 【1クール】 14 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
P-mab	6mg/kg	点滴静注	60分	day1
CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	90分	day1
ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day1
5-FU	400mg/m ²	静注		day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1

【備考】

【対象疾患】 大腸がん

【レジメン名】 IRIS+P-mab 【1クール】 28 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
P-mab	6mg/kg	点滴静注	60分	day1.15
CPT-11	100mg/m ²	点滴静注	90分	day1.15
S-1	80-120mg/body/日	内服	分2朝夕食後	day1-14

【備考】

【対象疾患】 大腸がん

【レジメン名】 FOLFIRI+R-mab 【1クール】 14 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
R-mab	8mg/kg	点滴静注	60分	day1
CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	90分	day1
ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day1
5-FU	400mg/m ²	静注		day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1

【備考】

【対象疾患】 大腸がん

【レジメン名】 FOLFIRI+C-mab 【1クール】 14 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
C-mab	初回400mg/m ² 、2回目-250mg/m ²	点滴静注	60分	day1
CPT-11	150mg/m ²	点滴静注	90分	day1
ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day1
5-FU	400mg/m ²	静注		day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1

【備考】

【対象疾患】 胆道がん

【レジメン名】 GC 【1クール】 21 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
CDDP	25mg/m ²	点滴静注	1時間	day1.8
GEM	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1.8

【備考】

【対象疾患】 膵がん

【レジメン名】 S-1+GEM 【1クール】 21 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
GEM	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1.8
S-1	下記参照	内服	分2朝夕食後	day1-14

【備考】 S-1標準投与量

体表面積 1.25m²未満:60mg/日

1.25m²以上1.5m²未満:80mg/日

1.5m²以上:100mg/日

【対象疾患】 膵がん

【レジメン名】 GEM 【1クール】 28 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
GEM	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1.8.15

【備考】

【対象疾患】 膵がん

【レジメン名】 FOLFIRINOX 【1クール】 14 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
ℓ-OHP	85mg/m ²	点滴静注	2時間	day1
ℓ-LV	200mg/m ²	点滴静注	2時間	day1
CPT-11	180mg/m ²	点滴静注	90分	day1
5-FU	400mg/m ²	静注		day1
5-FU	2400mg/m ²	持続静注	46時間	day1

【備考】

【対象疾患】 膵がん

【レジメン名】 nab-PTX+GEM

【1クール】 28 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
nab-PTX	125mg/m ²	点滴静注	30分	day1.8.15
GEM	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1.8.15

【備考】

【対象疾患】 前立腺がん

【レジメン名】 DTX+PSL

【1クール】 21 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
DTX	75mg/m ²	点滴静注	1時間以上	day1
プレドニゾロン	10mg/日	内服	分2	day1-21

【備考】

【対象疾患】 膀胱がん

【レジメン名】 M-VAC

【1クール】 28 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
MTX	30mg/m ²	点滴静注	30分	day1.15.22
VLB	3mg/m ²	点滴静注	30分	day2.15.22
ADM	30mg/m ²	点滴静注	30分	day2
CDDP	70mg/m ²	点滴静注	2時間	day2

【備考】

【対象疾患】 膀胱がん

【レジメン名】 GC

【1クール】 28 日

医薬品名	標準投与量	投与方法	投与時間	投与日
GEM	1000mg/m ²	点滴静注	30分	day1.8.15
CDDP	70mg/m ²	点滴静注	2時間	day2

【備考】